



AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITARĂ

OFICIUL FITOSANITAR MUREȘ
Str. Dezrobirii, nr. 80, Tg. Mureș,
tel. 0265435245
e-mail: ofimures@anfof.ro
Nr. 43 din 29.01.2024

| | | |
|-----------------------|------------------|-------------------|
| JUDEȚUL MUREȘ | | |
| MUNICIPIUL SIGHISOARA | | |
| Nr. | 3759/29 | |
| Ziua | 30 | Luna 01 Anul 2024 |
| Anexa | IX. } 30.01.2024 | |
| | VI.11/2 | |

BULETIN DE AVERTIZARE Nr. 1./29.01.2024
TRATAMENT LA SOL – SPATII PROTEJATE

Pentru prevenirea și combaterea organismelor dăunătoare: DEZINFECTIA ȘI DEZINSECTIA AMESTECULUI DE PĂMÂNT, A UNELTELOR ȘI A SCHELETULUI RĂSADNIȚELOR.

Prevenirea și diminuarea pagubelor produse culturilor de legume de către dăunătorii și agenții patogeni constau în: Dezinfecția amestecului de pământ cât și a semințelor pentru producerea de răsaduri sănătoase. Pentru aceasta recomandăm tratamente fitosanitare înainte de semănat cât și în perioada de răsărire a plantelor.

1 Amestecul de pământ se va pregăti cu 5 – 7 zile înainte de semănat, pentru combaterea bolilor și a nematozilor: *Fusarium spp.* (Fuzarioza), *Phytophthora spp.* (Mana), *Verticillium spp.* (Ofilirea vasculară), *Meloidogyne spp.* (Nematodul galicolic al rădăcinilor) se va efectua cu:

RAISAN 51 – 700 litri/ha; (aplicat înainte de semănat sau plantat);

2. Amestecul de pământ care se refolosește, se va dezinfecța pentru combaterea bolilor și a nematozilor : *Fusarium spp.* (Fuzarioza), *Phytophthora spp.* (Mana), *Verticillium spp.* (Ofilirea vasculară), *Meloidogyne spp.* (Nematodul galicolic al rădăcinilor):

BASAMID GRANULE – 500 kg/ha.

3. Dacă nu s-a efectuat dezinfecția înainte de semănat cu 5–7 zile, amestecul de pământ se poate dezinfecța cu:

PREVICUR ENERGY – 3,0 litri/ ha (3ml/ mp) tratament aplicat la sol prin picurare.

4. Imediat după semănat / răsărit, se stropește patul germinativ la suprafață cu 10 – 15 litri soluție / 100 mp de semănătură cu: **PREVICUR ENERGY – 0,3%**, la care se adaugă **MERPAN 80 WDG (CAPTAN 80 WDG) – 0,15% (4 – 5 l soluție / mp)** sau alte produse pentru protecția plantelor omologate pentru a fi utilizate pe teritoriul României.

Perioada optimă de tratament; **semănat – răsărit.**

Alte recomandări:

Verificați cu atenție recomandările referitoare la compatibilitatea produselor atunci când intenționați să aplicați amestecuri de produse de protecția plantelor!

Luți măsurile ce se impun pentru protecția mediului inconjurător!

Respectați cu strictețe normele de lucru cu produse pentru protecția plantelor, normele de protecție și securitatea muncii, de protecție a albinelor și a animalelor în conformitate cu: Legea nr. 383/ 2013 a apiculturii cu modificările și completările ulterioare și Ordinul nr. 127/ 1991 al ACA din România, Ordinul comun nr. 45/ 1991 al Ministerului Agriculturii și Alimentației, 15b/ 3404/ 1991 al Dep. Pentru Administrație Locală și 1786/TB/ 1991 al Ministerului Transporturilor precum și cu Protocolul de colaborare nr. 328432/ 2015, încheiat cu ROMAPIS (privind implementarea legislației, în vederea protecției familiilor de albine împotriva intoxicației cu produse pentru protecția plantelor);

Respectați prevederile Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 297/ 2017 privind aprobarea Codului de bune practici pentru utilizarea în siguranță a produselor de protecția plantelor.

Respectați obligațiile ce vă revin conform Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, al ministrului mediului, apelor și pădurilor și al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 352/ 636/ 54/ 2015 pentru aprobarea normelor privind ecocondiționalitatea în cadrul schemelor și măsurilor de sprijin pentru fermieri în România, cu modificările ulterioare.

Se pot utiliza și alte produse pentru protecția plantelor omologate pentru a fi utilizate pe teritoriul României recomandate în lista oficială PEST- EXPERT <https://aloe.anfd.ro> (utilizator și parolă: **guest**) pentru testele avertizate, Link-ul poate fi accesat din aplicația Mozilla/ **firefox-portable-45-0.exe** (<http://www.anfof.ro/index/pestexpert.html>).

Măsuri alternative de combatere: mecanice; fizice; biologice.

Metode durabile: biologice, fizice, mecanice și alte metode nechimice trebuie preferate metodelor chimice, dacă acestea asigură un control corespunzător al organismelor dăunătoare.

ATENȚIE! Pentru siguranță, în cazul utilizării produselor chimice pentru dezinfecție, înainte de semănatul răsadurilor, se face testul de fitotoxicitate al solului folosind plante indicatoare (ex salata - se vor semăna cateva semințe de salată în solul dezinfecat, și se va urmări răsăririle lor).


Se trece la înființarea culturii cu semințe după 3-4 zile dacă nu se observa efecte de fitotoxicitate.

Se vor respecta cu strictețe indicațiile trecute în prospectul fiecărui produs folosit.

Reamintim producătorilor agricoli obligativitatea respectării prevederilor legale privind depozitarea, manipularea, utilizarea produselor de protecția plantelor și completarea la zi a Registrului privind evidența tratamentelor fitosanitare.

Respectarea prevederilor legale privind utilizarea pesticidelor este verificată prin controale în teren de inspectorii Oficiului fitosanitar și APIA.

SEF SERVICIU
Dr. ing. Pogăcian Marian



Intocmit
Ing. Bologa Vasile

