



Nr. 446 / 12.09.2025

BULETIN DE AVERTIZARE Nr. 51 din 11.09.2025



Pentru prevenirea și combaterea organismelor dăunătoare: **Phyllotretaspp. (puricii de pământ); Psylliodeschrysocephala (puricele albastru al rapitei); Athaliarosae (viespea rapitei)**, care pot cauza pierderi importante la cultura de RAPITĂ.

Phyllotretaspp. (purici de pământ), dăunătorul poate produce pagube mari în culturile de rapita. Adultii rod epiderma superioară și parenchimul sub formă de orificii circulare; aspect ce poartă denumirea de "ciuruirea frunzelor". Frunzele atacate puternic se usuca și poate duce la compromiterea culturii.



Psylliodeschrysocephala (puricele albastru al rapitei), dăunătorul are o singură generație pe an. Apogeul apariției adulților este la sfârșitul lunii septembrie, când aceștia mănâncă frunzele și lăstariile plantelor de rapita. După aproximativ două săptămâni, femelele încep depunerea pontelor la 1-2 cm. adâncime în sol în apropierea plantei, eclozarea putând avea loc în orice moment începând cu luna octombrie, în funcție de temperatură. Daunele cele mai importante sunt produse de către larve care rod tuneluri prin petiolul frunzelor și tulpinilor în care deseori patrunde apa ce îngheață și duce la crăparea acestora. Aceste zone reprezintă porți de intrare pentru o serie de ciuperci patogene ca *Phoma l.* Pe fondul unei vigori mult slabite de atacul adulților, larvele de *Psylliodes c.*, pot provoca uneori moartea plantelor de rapita.

Athaliarosae (viespea rapitei) are două generații pe an, iernând ca larvă complet dezvoltată în sol. Larvele abia eclozate mănâncă frunzele; cele mai dezvoltate rod epiderma inferioară și mezofilul frunzelor. În primele stadii de dezvoltare, larvele produc orificii în frunze, iar în stadii mai avansate consumă frunzele complet, lăsând intacte numai nervurile principale, rezultând defolierea aproape completă a plantei, la atacuri puternice, plantele se usuca. Pagubele cele mai mari le dau larvele generației de toamnă. Pentru prevenirea și combaterea se recomandă executarea tratamentului, numai pe parcelele pe care s-au realizat următoarele condiții: Depășirea pragului economic de daunare (15% plante atacate).



Pentru efectuarea tratamentului, folosiți unul din produsele sau amestecurile de mai jos, după caz:
MOSPILAN 20 SG /KRIMA 20 SG - 0,150 kg/ha sau MOSPILAN 20 SP /GAZELE - 0,15 kg/ha sau CYCLONE /FASTER GOLD 50EC - 0,1 l/ha sau VANTEX 60 CS / NEXIDE 60 CS - 50-80 ml / ha sau DECIS EXPERT 100 EC -75 ml /ha sau alte produse pentru protecția plantelor omologate, pentru a fi utilizate pe teritoriul României.
Tratamentul se va complexa cu fungicide pentru combaterea bolii: **Phomalingam**



Phomalingam. (putregaiul negru), primele simptome apar de regulă toamna, atunci când temperaturile sunt mai ridicate și există umiditate crescută, condiții optime pentru dezvoltarea ciupercii. Organele atacate sunt frunzele, pe care se pot observa pete relativ circulare de culoare alb-cenusiu, la început, urmând ca mai apoi să se poată observa picniidiile de culoare cenușiu-roz. La reluarea ciclului vegetativ, boala se poate instala și la baza plantei la nivelul coletului, unde în condiții optime, va reuși să întrerupă aprovizionarea plantei cu elemente nutritive din sol.

FOLICUR SOLO 250 EW /VALOR 250 EW - 0,5 l/ha sau ZIZAN 500 SC /AMBROSSIO 500 SC - 0,5 l/ha aplicat preventiv sau la primele simptome ale bolii sau **DAFNE 250 EC (ILA 250 EC) - 0,5 l/ha** sau în combinație **ZIZAN 500SC - 0,3 l/ha + DAFNE 250 EC (ILA 250 EC) - 0,2 l/ha** sau alte produse pentru protecția plantelor omologate pentru a fi utilizate în România. Perioada optimă de tratament: după răsarirea culturii.

ATENȚIE! Intotdeauna utilizați produsele de protecție a plantelor conform recomandărilor de pe etichetă!

Alte recomandări: Pentru aderarea soluției pe plantă, în soluția de stropit se adaugă un adeziv (**SILWET GOLD - 0,1% sau ARACET - 0,2 %**).

Utilizati produsele de protectie a plantelor conform recomandarilor de pe eticheta!

Luati masurile ce se impun pentru protectia mediului inconjurator!

Respectati cu strictete normele de lucru cu produse de protectie a plantelor, cele de securitate a muncii, de protectie a animalelor si familiilor de albine in conformitate cu: Legea Apiculturii nr. 383/2013, cu modificarile si completarile ulterioare si Ordinul 127/1991 al ACA din Romania , Ordinul comun nr. 45/1991 al MAA 15b/3404/1991 al Departamentului pentru Administratie Locala si 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor precum cu Protocolul de colaborare nr. 328432/2015, incheiat cu ROMAPIS (privind implementarea legislatiei, in vederea protectiei familiilor de albine, impotriva intoxicatiilor cu produse pentru protectia plantelor. Respectati prevederile Ordinului MADR, nr 297/2017 privind aprobarea Codului de bune practici pentru utilizarea in siguranta a produselor de protectie a plantelor.

Respectati obligatiile ce va revin conform Ordinului MADR, Ministerului Mediului, Apelor si Padurilor si al presedintelui ANSVSA nr. 352/636/542015 pentru aprobarea normelor privind ecoconditionalitatea in cadrul schemelor si masurilor de sprijin pentru fermieri in Romania, cu modificarile ulterioare.

Utilizati doar produse de protectie a plantelor omologate si recomandate de codexul PEST EXPERT, pentru testele avertizate, omologate de catre „Comisia Intermistrială de Omologare a Produselor de Uz Fitosanitar”, avizate pentru a fi folosite pe teritoriul ROMÂNIEI, accesand link-ul <https://aloe.anfd.ro/> , utilizator si parola: **guest**. Pentru a putea folosi baza de date pestexpert va rugam sa folositi versiunea 45.0 a browserului Mozilla Firefox pe care o puteti descarca in versiune portabila link-ul: <https://aloe.anfd.ro/> .

ANEXA LA BULETINUL DE AVERTIZARE.

Produsele fitosanitare trebuie să fie utilizate în mod corespunzător. Utilizarea lor corectă include aplicarea principiilor bunelor practici fitosanitare si îndeplinirea conditiilor stabilite în conformitate cu articolul 31 si specificate pe etichetă. Aceasta respectă, de asemenea, dispozitiile Directivei 2009/128/CE si, în special, principiile generale de combatere integrată a dăunătorilor prevăzute la articolul 14 si în anexa III la respectiva directivă.

In vederea protejarii sanatatii oamenilor si a animalelor, protectiei albinelor si a mediului inconjurator, producatorii agricoli, persoane fizice sau juridice, care utilizeaza pe terenurile pe care le detin produse de uz fitosanitar din grupele Xn (nocive) si Xi (iritante) de toxicitate, au obligatia sa le depoziteze, sa le manipuleze si sa le utilizeze in conformitate cu instructiunile tehnice care le insotesc, aprobate potrivit legii.

Constituie contravenții următoarele fapte:

nerespectarea prevederilor art. 28 din Regulamentul (CE) nr. 1.107/2009 privind introducerea pe piață și utilizarea produselor de protecție a plantelor autorizate;

nerespectarea de către utilizatori a prevederilor art. 67 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 1.107/2009 privind menținerea evidenței pe o perioadă de cel puțin 3 ani a produselor de protecție a plantelor pe care le utilizează:

Nume și prenume fermier/soc. comercială.....

Domiciliu fermier/sediul social al societății (Comuna, județul)

Ferma (nume/număr, adresa).....

REGISTRU de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor

Data efectuării tratamentului	Cultura și locul unde este situat terenul	Tipul aplicării	Tratamentul efectuat					Numele persoanei responsabile pt efectuare a tratamentului. Semnătura	Data începerii recoltării produsului agricol	Nr și data doc prin care s-a dat în consum populației	
			Agenti de dăunare combătuți Boli/dăunătorii / buruieni	Denumire produs de protecție a plantelor folosit	Doza :		Supra- fața (ha)				Canti- tăți utiliza- te (kg/l)
					Omolo- gată	Folosi- tă					

(Conform Reg. CE nr. 1107/2009, art. 67, (1)) Producătorul agricol numerotează paginile registrului. Pe spatele registrului (pe ultima pagină) se menționează câte pagini conține registrul, purtând semnătura (și ștampila după caz) fermierului sau administratorului societății. Inspectorii Oficiului Fitosanitar pot sancționa fermierul, conform H.G. nr. 1230 din 12 decembrie 2012 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Reg. (CE) nr. 1.107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare și de abrogare a Directivelor 79/117/CEE și 91/414/CEE ale Consiliului, art. 3, pct 1 (i), (1) Constituie contravenții următoarele fapte: i.) nerespectarea de către utilizatorii profesioniști a prevederilor art. 67 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 1.107/2009 privind menținerea evidenței pe o perioadă de cel puțin 3 ani a produselor de protecție a plantelor pe care le utilizează.

IN ATENȚIA FERMIERILOR !!! Respectarea condițiilor de depozitare, manipulare și utilizare a produselor de protecție a plantelor în exploatarea agricolă, conform Ghidului de bune practici de utilizare și depozitare a produselor de protecție a plantelor, elaborat de AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITARĂ. Pentru mai multe detalii accesați: <http://www.madr.ro/norme-de-eco-conditionalitate-in-domeniul-fitosanitar.html>.

Coordonator
Dr. ing. Cristea Olga



Intocmit
ing. Bologa Vasile

